

Protocole d'utilisation du test de dépistage urinaire RATISBONNE

Le test Ratisbonne permet une décision rapide et sécurisée pour l'initialisation d'un traitement de substitution aux opiacés ainsi que pour le suivi thérapeutique ultérieur.

Présentation du test Ratisbonne (société Nal²⁴)

C'est un test urinaire rapide pour la détection des drogues et toxiques.

D'utilisation facile (pas de matériel annexe) et pratique (emballage individuel), le test livre des résultats complets une à cinq minutes après l'immersion du dispositif dans les urines.

Les tests permettent la détection de la buprénorphine, de la méthadone, des opiacés...

Le délai de détection des différentes substances en milieu urinaire est variable d'une substance à l'autre (voir tableau au verso), de quelques heures à quelques jours.

Le test est commercialisé sous forme individuelle, de manière à répondre aux besoins particuliers des différentes catégories d'utilisateurs.

Ils bénéficient d'une conservation longue : deux années à température ambiante, la date de péremption étant précisée sur chaque emballage individuel.

Utilisation du test

Dans quel(s) cas utiliser ce test:

- primo-prescription d'un traitement de substitution, dans le but de confirmer que le patient n'est pas naïf aux opiacés
- dans le cadre de l'alliance thérapeutique, pour objectiver avec le patient la réalité des consommations lors de la prise en charge initiale
- l'interprétation du test peut permettre d'ouvrir le dialogue sur les risques liés à l'association de certains produits et/ou médicaments
- suivi de traitement de substitution aux opiacés
 - observance thérapeutique
 - documentation d'une reprise des consommations associées en vue d'adapter les posologies des médicaments de substitution aux opiacés
 - évoquer avec le patient usager abusif d'alcool ou alcoolo-dépendant les risques des associations de produits et/ou de médicaments

Les limites de l'utilisation du test dans le cadre du réseau

- utilisation à des fins judiciaires
- visite de pré-embauche et situations diverses de contrôle en médecine du travail
- analyse urinaire à la demande des parents d'un usager ou d'un patient mineur

Dans ces situations, il est préférable de faire appel à un laboratoire d'analyses biologiques en ville.

.../...

Siège social de l'A.D.I.J.A. : Maison des Associations - 9 avenue Aristide Briand - 39100 DOLE

☎ : 03.84.79.56.85/09 64 02 49 86 - ✉ : 03.84.82.83.88 - @ : adijajura@orange.fr

N° SIRET : 48385594600016 - Code APE : 8899B

Déclaration d'activité formation enregistrée sous le n°43 39 00799 39 auprès du Préfet de région Franche-Comté

Temps limite de détection de drogue dans l'urine

Drogues	Temps lim. de détection en jours
Amphétamine	1-3 jours
Barbiturique	
• courte efficacité, par ex. Sécobarbital	1 jour
• longue efficacité, par ex. Phénobarbital	jusqu'à 20 jours
Benzodiazépine	
• en dose thérapeutique	1-3 jours
• en traitement de longue durée	25-40 jours
Buprénorphine	2-6 jours
Cocaine	2-3 jours
Méthadone	2-5 jours
Méthamphétamine	1-3 jours
MDMA/XTC	1-3 jours
Morphine/Opiacé	
• forte dépendance de la dose	2-5 jours
Phencyclidine	2-3 jours
Tétrahydrocannabinol	
• consommation unique	2-3 jours
• consommation moyenne	5-20 jours
• consommation chronique	21-60 jours
Antidépresseur tricyclique	2-3 jours